



Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular y para qué se utiliza
2. Antes de tomar VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular
3. Cómo tomar VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular

VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular

Valaciclovir

Cada comprimido contiene:

Valaciclovir (hidrocloruro).....1000 miligramos

Los demás componentes son: crospovidona, celulosa microcristalina, povidona K90, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, hipromelosa, dióxido de titanio (E171), macrogol 400, polisorbato 80, cera de carnauba y tinta de impresión azul FT203 (propilenglicol, goma laca, azul brillante FCF (E133), lactato de sodio y polidimetilsiloxano).

Titular:

GlaxoSmithKline, S.A.
P.T.M.- C/Severo Ochoa, nº 2
28760 Tres Cantos (Madrid).

Responsable de la fabricación:

Glaxo Wellcome, S.A.
Avda. Extremadura, 3
09400 Aranda de Duero (Burgos).

1. QUÉ ES VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular Y PARA QUÉ SE UTILIZA

VALTRES 1 g se presenta en un envase conteniendo 21 comprimidos con cubierta pelicular.

VALTRES pertenece al grupo de medicamentos denominados antivirales.

VALTRES está indicado para el tratamiento de infecciones producidas por Herpes Zóster.

2. ANTES DE TOMAR VALTRES 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular

No tome VALTRES:

En caso de haber experimentado previamente una reacción alérgica a valaciclovir, aciclovir o a cualquier componente de la formulación de VALTRES.

Tenga especial cuidado con VALTRES:

Si padece de alguna enfermedad del riñón o hígado.

Embarazo

Si Vd. está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico o farmacéutico acerca de la conveniencia de tomar VALTRES.

Lactancia

VALTRES pasa a la leche, por lo que se desaconseja que amamante a su hijo/a durante el tratamiento.

CORREO ELECTRÓNICO

smhem@agemed.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 50 73
FAX: 91 822 51 61

Toma o uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR VALTREX 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular:

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con VALTREX. No suspenda el tratamiento antes.

Para el tratamiento del Herpes Zóster la dosis habitual en adultos es de 1 comprimido (1 gramo) de VALTREX tres veces al día durante 7 días. La mayoría de los pacientes suelen tomar una dosis al levantarse por la mañana, otra al mediodía y otra al acostarse por la noche. El espaciado de las dosis a lo largo del día ayudará a reducir la erupción y las molestias.

En caso de padecer alguna enfermedad en el riñón, su médico le indicará si es necesario reducir las dosis del medicamento. Siga siempre las instrucciones del médico.

Tomar los comprimidos con algo de agua. Es importante beber mucha agua mientras esté recibiendo tratamiento con VALTREX.

Si estima que la acción de VALTREX 1 g es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si Vd. toma más VALTREX del que debiera:

Si Usted ha tomado más VALTREX 1 g de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 5620420.

Si olvidó tomar VALTREX:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente aguarde a la siguiente toma.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, VALTREX puede tener efectos adversos.

Raras veces los medicamentos pueden causar reacciones alérgicas graves.

Si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos avise a su médico tan pronto como sea posible:

- molestias en el estómago como sensación de náuseas, vómitos, diarrea y dolor en el estómago
- dolor de cabeza
- erupción cutánea (la cual también puede aparecer tras la exposición a luz ultravioleta p.ej. al tomar el sol o rayos UVA)
- procesos infecciosos poco comunes o de evolución inusual
- cardenales o hemorragias poco comunes.

También se han descrito los siguientes efectos adversos que son más comunes en pacientes con alteraciones renales o en aquellos que toman dosis altas de VALTREX.

Los siguientes efectos adversos son frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 100 y menos de 1 de cada 10 personas que utilizan VALTREX:

- náuseas
- dolor de cabeza



Los siguientes efectos son poco frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 1000 y menos de 1 de cada 100 personas que utilizan VALTREX:

- disnea (dificultad para respirar)
- erupción cutánea, algunas veces causada por sensibilidad a la luz solar

Los siguientes efectos adversos son raros y pueden producirse en más de 1 de cada 10.000 y menos de 1 de cada 1000 personas que utilizan VALTREX:

- mareo
- confusión o visiones o sonidos imaginarios (alucinaciones)
- somnolencia
- molestias abdominales
- vómitos
- diarrea
- prurito (picor en la piel)
- alteración de los riñones

Los siguientes efectos adversos son muy raros y pueden producirse en menos de 1 de cada 10.000 personas que utilizan VALTREX:

- agitación
- coma
- trombocitopenia (falta de plaquetas que puede dar lugar a que se formen hemorragias o cardenales con facilidad)
- leucopenia (disminución de glóbulos blancos que puede dar lugar a que se produzcan infecciones)
- anafilaxia (reacción alérgica grave y rápida)
- temblor
- ataxia (movimientos poco firmes, tambaleantes)
- disartria (problemas para hablar, pronunciación poco clara)
- convulsiones
- encefalopatía (alteración en el cerebro)
- alteraciones en la personalidad y en el comportamiento de la persona
- aumentos reversibles en las pruebas funcionales del hígado
- urticaria
- angioedema (hinchazón de los labios, los ojos o la lengua)
- fallo grave de los riñones

VALTREX puede alterar las pruebas de función hepática. Ésta es una prueba sanguínea que permite a su médico conocer el correcto funcionamiento de su hígado. Si se producen algunos cambios debidos al VALTREX, no se preocupe, ya que volverán a la normalidad una vez que termine el tratamiento con VALTREX.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE VALTREX 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular

Mantenga VALTREX 1 g, Comprimidos con cubierta pelicular fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Caducidad:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.



OTRAS PRESENTACIONES:

VALTREX 500 mg, Comprimidos con cubierta pelicular: envases conteniendo 10 y 42 comprimidos.

Este prospecto ha sido aprobado en septiembre del 2005